



# Bonjesta®

## מינון

- המינון ואופן הטיפול ב**בונג'סטא** יקבעו ע"י הרופא בלבד. המינון המקובל נע בין 1 ל-2 טבליות ליממה, בהתאם לסימפטומים, **כמפורט בטבלה מעברו השני של הדף**.
- אין לבלוע יותר מ-2 טבליות ביממה.
  - יש לבלוע את הטבליה בשלמותה על **קיבה ריקה עם כוס מים**. אין לכתוש, ללעוס או לחצות את הטבליה.
  - אם נשכחה מנה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. יש ליטול את המנה הבאה בזמן הרגיל ולהימנע ברופא.
  - גם אם חל שיפור במצבך, אין להפסיק את הטיפול ב**בונג'סטא** ללא התייעצות עם הרופא המטפל. בהפסקת הטיפול ב**בונג'סטא** מומלץ להפחית את המינון באופן הדרגתי כדי למנוע מצב של חזרה של בחילות/הקאות.

\* ההתוויה המאושרת בישראל: בונג'סטא מאושרת לטיפול בבחילות ובהקאות בהריון בנשים שאינן מגיבות לטיפול שמרני.

## הוראות השימוש בבונג'סטא

- להלן הסבר קצר על קביעת המינון הדרוש בשימוש ב**בונג'סטא** (Bonjesta)\*, טבליות בשחרור ממושך לטיפול בבחילות ובהקאות בהריון.
- כל טבליה בשחרור ממושך מכילה 20 מ"ג דוקסילמין סוקצינאט ו-20 מ"ג פירידוקסין הידרוכלוריד.
- הנחיות אלה הן חלק מהמידע המופיע בעלון לצרכן המצורף לתרופה, אותו יש לקרוא בעיון עד סופו טרם השימוש בתרופה.

**לתשומת ליבך!**  
יש להקפיד  
על נטילה יומיומית



## כיצד להשתמש בתרופה? איור והסבר

		<p>יש לבלוע טבליה אחת של בונג'סטה לפני השינה.</p>	<p><b>יום 1</b></p>
		<p>יש להמשיך לבלוע טבליה אחת בכל ערב לפני השינה. מעתה זה יהיה המינון הקבוע שלך.</p>	<p><b>אם יש שיפור בבחילות ובהקאות</b></p>
		<p>יש לבלוע טבליה אחת בבוקר וטבליה אחת לפני השינה זהו גם המינון המירבי לתרופה: 2 טבליות ביממה.</p>	<p><b>יום 2</b></p> <p><b>אם עדיין קיימות בחילות והקאות</b></p>